

## Behandelschema van de derde kuur van het HOVON 37 schema

5 mei 2004

Deze kuur bestaat uit 3 verschillende middelen. Daarnaast kunnen nog enkele andere medicijnen voorgeschreven worden. Deze dienen als ondersteuning van de behandeling, bijvoorbeeld om bijwerkingen te beperken.

Deze kuur kan meestal grotendeels poliklinisch worden toegediend. Gedurende dag 1-3 en 15-17 is het nodig om in het ziekenhuis te worden opgenomen.

	Week 1							Week 2							Week 3							Week 4						
	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7
methotrexate, per infuus in 1 uur																												
l-asparaginase, per infuus in 1 uur																												
mercaptopurine, per tablet																												

methotrexate, (+ prednisolon) via een ruggenprik	Gedurende deze kuur wordt deze combinatie 1x toegediend.
--------------------------------------------------	----------------------------------------------------------

Vanaf week 4 zijn de cytostatica uw lichaam uit.

De volgende kuur start in principe als de bloedsuitslagen goed zijn.

In **behandelwijzer chemotherapie** kunt u lezen welke bijwerkingen in het algemeen vaak voorkomen bij chemotherapie en welke maatregelen u tegen een aantal van deze bijwerkingen kunt nemen.

Bij deze kuur kunnen eventueel de volgende specifieke bijwerkingen ontstaan:

- U kunt vermoeidheidsklachten krijgen, ook na afloop van de gehele behandeling kunnen deze klachten aanhouden.
- Deze kuur kan misselijkheid en braken veroorzaken. Het kan zijn dat u tijdelijk minder of geen trek hebt in eten.
- De aanmaak van bloedcellen in het beenmerg kan tijdelijk worden geremd. Als gevolg daarvan kunt u bloedarmoede krijgen, vatbaar worden voor infecties en u kunt snel blauwe plekken krijgen en/of last krijgen van spontane bloedingen.
- Het slijmvlies van de mond kan ontstoken raken. U kunt daardoor blaasjes en pijn in de mond krijgen. Een goede mondverzorging is daarbij belangrijk.
- De slijmvlies van de darm kunnen geïrriteerd raken. U kunt daardoor diarree krijgen.
- De slijmvlies van de ogen kunnen soms geïrriteerd raken. U kunt daardoor droge, prikkelende ogen krijgen.
- Uw smaak kan tijdelijk veranderen.
- De werking van uw nieren kan worden aangetast. Dit wordt voorkomen door u tijdens de behandeling extra vocht toe te dienen.
- Deze behandeling kan onvruchtbaarheid veroorzaken.
- Door de ruggenprik kunt u hoofdpijn krijgen.