

Behandelschema van de eerste kuur van het HOVON 37 schema

Deze kuur bestaat uit 5 verschillende middelen. Daarnaast kunnen nog enkele andere medicijnen voorgeschreven worden. Deze dienen als ondersteuning van de behandeling, bijvoorbeeld om bijwerkingen te beperken.

Voor deze kuur is het nodig dat u in het ziekenhuis wordt opgenomen. Meestal duurt deze opnameperiode 4 à 5 weken.

	Week 1							Week 2							Week 3							Week 4						
	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7
prednisolon, per tablet																												
vincristine, per infuus in 5 – 10 minuten																												
daunorubicin, per infuus in 5 – 10 minuten																												
I-asparaginase per infuus in 30 minuten																												

methotrexate, (+ prednisolon) via een ruggenprik	Gedurende de eerste kuur wordt deze combinatie 3 maal toegediend.
--	---

Vanaf week 5 zijn de cytostatica uw lichaam uit.

Bij deze kuur is het nodig om selectieve darm decontaminatie (SDD) medicijnen te gebruiken.

De volgende kuur start in principe als de bloedsuitslagen goed zijn.

4 mei 2004

In de **behandelwijzer chemotherapie** kunt u lezen welke bijwerkingen in het algemeen vaak voorkomen bij chemotherapie en welke maatregelen u tegen een aantal van deze bijwerkingen kunt nemen. Bij deze kuur kunnen eventueel de volgende specifieke bijwerkingen optreden:

- Deze kuur kan misselijkheid en braken veroorzaken. Het kan zijn dat u tijdelijk minder of geen trek hebt in eten.
- Uw haar gaat uitvallen, dit is van tijdelijke aard, en begint meestal in de 3^e of 4^e week. Het kan met een pijnlijke hoofdhuid beginnen. Een pruik kan nodig zijn. Herstel van de haargroei begint na 5 weken na het einde van de kuur.
- De aanmaak van bloedcellen in het beenmerg kan tijdelijk worden geremd. Als gevolg daarvan kunt u bloedarmoede krijgen, vatbaar worden voor infecties en u kunt snel blauwe plekken krijgen en/of last krijgen van spontane bloedingen.
- Het slijmvlies van de mond kan ontstoken raken. U kunt daardoor blaasjes en pijn in de mond krijgen. Een goede mondverzorging is daarbij belangrijk.
- Door de prednisolon kan uw eetlust tijdelijk groter worden. Er kan een tijdelijke vorm van suikerziekte ontstaan.
- Door de prednisolon kan uw uiterlijk tijdelijk veranderen.
- Door de prednisolon kan uw stemming wisselen van heel erg goed tot neerslachtig.
- Door de vincristine is obstipatie (verstopping) tijdens en na de kuur mogelijk. Ter preventie krijgt u daarom medicijnen voorgeschreven die de ontlasting zacht houden.
- Door de daunorubicine kan de urine tot enkele dagen na de kuur een rode kleur krijgen.
- Door de L-asparaginase kunnen stollingsproblemen ontstaan. Soms kan het nodig zijn om een transfusie van donorplasma toe te dienen om de bloedstolling te verbeteren.
- Door de ruggenprik kunt u hoofdpijn krijgen.
- Haaruival begint meestal in de 3^e of 4^e week.
- Deze behandeling kan onvruchtbaarheid veroorzaken. Deze kuur kan van invloed zijn op de menstruatie en seksualiteit. De mate waarin is van vele factoren afhankelijk. Praat hierover met uw verpleegkundige en/of hematoloog.
- U kunt vermoeidheidsklachten krijgen, ook na afloop van de gehele behandeling kunnen deze klachten aanhouden.