

Behandelschema van de tweede kuur van het HOVON 37 schema

Deze kuur bestaat uit 3 verschillende middelen. Daarnaast kunnen nog enkele andere medicijnen voorgeschreven worden. Deze dienen als ondersteuning van de behandeling, bijvoorbeeld om bijwerkingen te beperken.

Voor deze kuur is het nodig dat u in het ziekenhuis wordt opgenomen. Meestal duurt deze opnameperiode 4 à 5 weken.

	Week 1							Week 2							Week 3							Week 4						
	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7
cytarabine, 2 x per dag per infuus in 3 uur																												
mitoxantrone, per infuus in 30 minuten																												

methotrexate, (+ prednisolon) via een ruggenprik	Gedurende deze kuur wordt deze combinatie 1x toegediend
--	---

Vanaf week 3 zijn de cyfostatica uw lichaam uit.

Bij deze kuur is het nodig om selectieve darm decontaminatie (SDD) medicijnen te gebruiken.

De volgende kuur start in principe als de bloedsuitslagen goed zijn.

5 mei 2004

In de **behandelwijzer chemotherapie** kunt u lezen welke bijwerkingen in het algemeen vaak voorkomen bij chemotherapie en welke algemene maatregelen u tegen een aantal van deze bijwerkingen kunt nemen.

Bij deze kuur kunnen eventueel de volgende specifieke bijwerkingen optreden:

- Deze kuur kan misselijkheid en braken veroorzaken. Het kan zijn dat u tijdelijk minder of geen trek hebt in eten.
- Uw haar gaat opnieuw uitvallen.
- De aanmaak van bloedcellen in het beenmerg kan tijdelijk worden geremd. Als gevolg daarvan kunt u bloedarmoede krijgen, vatbaar worden voor infecties en u kunt snel blauwe plekken krijgen en/of last krijgen van spontane bloedingen.
- Het slijmvlies van de mond kan ontstoken raken. U kunt daardoor blaasjes en pijn in de mond krijgen. Een goede mondverzorging is daarbij belangrijk.
- Door de cytarabine kunnen de slijmvliezen van de ogen soms geïrriteerd raken. U kunt daardoor droge, prikkelende ogen krijgen.
- Door de cytarabine kan de huid ter plaatse van de handen, voeten en oren gaan vervellen.
- Door de mitoxantrone kan de urine gedurende enkele dagen een blauw/groene kleur krijgen.
- Door de ruggenprik kunt u hoofdpijn krijgen.
- Deze behandeling kan onvruchtbaarheid veroorzaken.
- De behandeling kan van invloed zijn op de menstruatie en seksualiteit. De mate waarin is van vele factoren afhankelijk. Praat hierover met uw verpleegkundige en/of hematoloog.
- U kunt vermoeidheidsklachten krijgen, ook na afloop van de gehele behandeling kunnen deze klachten aanhouden.