



Behandelinformatie

bij chemotherapie / immunotherapie

HOVON 70

Acute lymfatische leukemie

Leeftijd vanaf 18 tot 40 jaar

Informatie over de consolidatie fase A

Deze kuur bestaat uit 4 verschillende middelen. Daarnaast worden nog enkele andere medicijnen voorgeschreven, zij dienen als ondersteuning van de behandeling, bijvoorbeeld om bijwerkingen te beperken. Deze kuur wordt poliklinisch gegeven. In onderstaand schema kunt u zien wanneer de verschillende middelen worden toegediend.

Consolidatie A

Dag	week 1							week 2							week 3							week 4						
	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7
Datum																												
thioguanine p.o. 1. x daags	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■							
cytarabine (ARA-C) 2 x daags per subcutane injectie	■	■						■	■						■	■												
cyclofosfamide in NaCl 0,9% in 15 min. i.v.	■														■													
methotrexaat, MTX (+ prednisolon) intrathecaal door arts	■																											
G-CSF* 2 x daags 5 µg/kg (<i>alleen indien leukafese volgt</i>)																						■	■	■	■	■	■	■
Leukaferese																												■

Vanaf 2 dagen na de laatste kuurdag zijn de cytostatica uw lichaam uit.

Bij deze kuur kan het nodig zijn om selectieve darm decontaminatie (SDD) medicijnen te gebruiken. De volgende kuur start in principe als de bloedsuitslagen goed zijn.

In “**de Brug**” kunt u lezen welke bijwerkingen in het algemeen vaak voorkomen bij chemotherapie en welke algemene maatregelen u tegen een aantal van deze bijwerkingen kunt nemen.

Bij deze behandeling kunnen de volgende specifieke bijwerkingen optreden:

- Deze kuur kan misselijkheid en braken veroorzaken. Het kan zijn dat u tijdelijk minder of geen trek hebt in eten.
- De aanmaak van bloedcellen in het beenmerg kan tijdelijk worden geremd. Als gevolg daarvan kunt u bloedarmoede krijgen, vatbaar worden voor infecties en u kunt snel blauwe plekken krijgen en/of last krijgen van spontane bloedingen.
- Door de ruggenprik kunt u hoofdpijn krijgen.
- Het slijmvlies van de mond kan ontstoken raken. U kunt daardoor blaasjes en pijn in de mond krijgen. Een goede mondverzorging is daarbij belangrijk. De slijmvlies van de darm kunnen geïrriteerd raken. U kunt daardoor diarree krijgen.
- Van de G-CSF (Neupogen®) kunt u bot- of spierpijn krijgen. Ook een griepig gevoel kan daarbij horen.

- In verband met het voorkomen van door prednison in de voorgaande kuur veroorzaakte botontkalking wordt alendroninezuur (Fosamax[®]) voorgeschreven.
- De cytarabine moet u zelf of een mantelzorgers bij u injecteren in het weefsel direct onder de huid. Dit heet een subcutane injectie. Van de verpleegkundige krijgt u instructie en materialen. Doe gebruikte injectienaalden in de speciale afvalcontainer en houd deze buiten het bereik en zicht van kinderen. Voer de speciale afvalcontainer af volgens de instructies van uw arts, verpleegkundige of apotheek. Doe gebruikte injectiespuiten nooit bij het normale huishoudelijke afval.
- Deze kuur kan van invloed zijn op de menstruatie, seksualiteit en vruchtbaarheid. De mate waarin is van vele factoren afhankelijk. Praat hierover met uw verpleegkundige en/of hematoloog.
- U kunt vermoeidheidsklachten krijgen, na afloop van de behandeling kunnen deze klachten langdurig aanhouden.

Disclaimer

Het VUmc heeft richtlijnen opgesteld voor het uitvoeren van verpleegkundige handelingen op de afdeling hematologie. Het VUmc aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor welke vorm van gebruik van (delen van) deze richtlijnen dan ook door derden.