



Behandelinformatie

bij chemotherapie / immunotherapie

HOVON 70

Acute lymfatische leukemie

Leeftijd vanaf 18 tot 40 jaar

Informatie over de onderhoudsbehandeling

Deze kuur bestaat uit 4 verschillende middelen, waarvan 3 cytostatica (vincristine, mercaptopurine/(6-MP en methotrexaat/(mtx) en prednison. Daarnaast kunnen nog enkele andere medicijnen voorgeschreven worden zoals alendroninezuur (Fosamax[®]) en ondansetron (Zofran[®]). Deze dienen als ondersteuning van de behandeling, bijvoorbeeld om bijwerkingen te beperken.

De kuur duurt 4 weken en wordt maximaal 14 keer achter elkaar herhaald. In onderstaand schema kunt u zien op welke momenten en op welke manier de middelen worden toegediend.

	Week 1		Week 2		Week 3		Week 4	
dag	1	2 t/m 7	8	9 t/m 14	15	16 t/m 21	22	23 t/m 28
prednison 1 x daags per tablet, 's ochtends innemen								
vincristine in NaCl 0,9% via infuus in 10 min.								
6-MP 1 x daags per os								
methotrexaat 1 x daags per tablet								

Omdat u continue cytostatica krijgt toegediend wordt u geadviseerd gedurende de hele periode van onderhoudsbehandeling beschermende maatregelen te treffen ten aanzien van omgaan met lichaamsvloeistoffen (zoals urine, ontlasting, maagsap etc).

In "de Brug" kunt u in het hoofdstuk **behandelwijzer chemotherapie** lezen welke bijwerkingen in het algemeen vaak voorkomen bij chemotherapie en welke maatregelen u tegen een aantal van deze bijwerkingen kunt nemen.

Bij deze kuur kunnen eventueel de volgende specifieke bijwerkingen optreden:

- De aanmaak van bloedcellen in het beenmerg kan tijdelijk worden geremd. Als gevolg daarvan kunt u bloedarmoede krijgen, vatbaar worden voor infecties en u kunt snel blauwe plekken krijgen en/of last krijgen van spontane bloedingen.
- Tijdelijk kan door de prednison uw eetlust toenemen. Er kan een tijdelijke vorm van suikerziekte ontstaan, daarom zal regelmatig uw bloedsuikerspiegel worden gecontroleerd.
- Door de prednison kan uw stemming wisselen van heel erg goed tot neerslachtig. In verband met mogelijke nachtelijke onrust adviseren wij om de prednison 's ochtends rond 10.00 in te nemen.
- Het slijmvlies van de mond kan ontstoken raken. U kunt daardoor blaasjes en pijn in de mond krijgen. Een goede mondverzorging is daarbij belangrijk.
- De slijmvliezen van de darm kunnen geïrriteerd raken. U kunt daardoor diarree krijgen. Neem bij diarree langer dan 2 dagen contact op met het ziekenhuis.
- Door de vincristine is obstipatie (verstopping) na de kuur mogelijk. Neem bij obstipatie langer dan 2 dagen contact op met het ziekenhuis.
- U kunt tintelingen en/of een doof gevoel in de vingertoppen en tenen krijgen. Als u van deze bijwerking last krijgt is het verstandig dit te melden bij uw behandelend arts.
- In verband met het voorkomen van door prednison veroorzaakte botontkalking wordt alendroninezuur (Fosamax[®]) voorgeschreven.
- Deze kuur is van invloed op de seksualiteit en vruchtbaarheid. De mate waarin is van vele factoren afhankelijk. Praat hierover met uw verpleegkundige en/of hematoloog.
- U kunt vermoeidheidsklachten krijgen, na afloop van de behandeling kunnen deze klachten langdurig aanhouden.

Disclaimer

Het VUmc heeft richtlijnen opgesteld voor het uitvoeren van verpleegkundige handelingen op de afdeling hematologie. Het VUmc aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor welke vorm van gebruik van (delen van) deze richtlijnen dan ook door derden.