



Behandelinformatie

bij chemotherapie / immunotherapie

HOVON 71

Inductiekuur 1 en 2

acute lymfatische leukemie(ALL)

Informatie over de cytarabine, l-asparaginase kuur

Leeftijd vanaf 40 t/m 70 jaar

Deze kuur bestaat uit 2 verschillende middelen. Daarnaast kunnen nog enkele andere medicijnen voorgeschreven worden. Deze dienen als ondersteuning van de behandeling, bijvoorbeeld om bijwerkingen te beperken.

Voor deze kuur wordt u opgenomen in het ziekenhuis. De opname duur is ongeveer 3-4 weken

		Week 1							Week 2							
		1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
2 x daags	Cytarabine per infuus															
1 x daags	l-asparaginase per infuus															

Vanaf week 3 zijn de cytostatica uw lichaam uit.

Bij deze kuur is het nodig om selectieve darm decontaminatie (SDD) medicijnen te gebruiken. U krijgt hier verdere uitleg over van de verpleegkundige.

De volgende kuur start in principe als de bloedsuitslagen goed zijn.

Disclaimer

Het VUmc heeft richtlijnen opgesteld voor het uitvoeren van verpleegkundige handelingen op de afdeling hematologie. Het VUmc aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor welke vorm van gebruik van (delen van) deze richtlijnen dan ook door derden.

In de **behandelwijzer chemotherapie** kunt u lezen welke bijwerkingen in het algemeen vaak voorkomen bij chemotherapie en welke maatregelen u tegen een aantal van deze bijwerkingen kunt nemen.

Bij deze kuur kunnen eventueel de volgende specifieke bijwerkingen optreden:

- Deze kuur kan misselijkheid en braken veroorzaken. Het kan zijn dat u tijdelijk minder of geen trek hebt in eten.
- Uw haar gaat uitvallen, dit is van tijdelijke aard, en begint meestal in de 3^e of 4^e week. Het kan met een pijnlijke hoofdhuid beginnen. Een pruik kan nodig zijn. Herstel van de haargroei begint na 5 weken na het einde van de kuur.
- De aanmaak van bloedcellen in het beenmerg kan tijdelijk worden geremd. Als gevolg daarvan kunt u bloedarmoede krijgen, vatbaar worden voor infecties en u kunt snel blauwe plekken krijgen en/of last krijgen van spontane bloedingen.
- Het slijmvlies van de mond kan ontstoken raken. U kunt daardoor blaasjes en pijn in de mond krijgen. Een goede mondverzorging is daarbij belangrijk.
- Door de cytarabine kunnen de slijmvliezen van de ogen soms geïrriteerd raken. U kunt daardoor droge, prikkelende ogen krijgen.
- Door de cytarabine kan de huid ter plaatse van de handen, voeten en oren gaan vervellen.
- Door de L-asparaginase kunnen stollingsproblemen ontstaan. Soms kan het nodig zijn om een transfusie van donorplasma toe te dienen om de bloedstolling te verbeteren.
- Deze behandeling kan onvruchtbaarheid veroorzaken. Deze kuur kan van invloed zijn op de menstruatie en seksualiteit. De mate waarin is van vele factoren afhankelijk. Praat hierover met uw verpleegkundige en/of hematoloog.
- U kunt vermoeidheidsklachten krijgen, ook na afloop van de gehele behandeling kunnen deze klachten aanhouden.

	Naam	Functie	Datum	Handtekening
Auteur	A.E. Nijntjes	Transplantatie coördinator		
Evaluatie	G.M.H. Bollen	Transplantatie coördinator		
Autorisatie	A.A. v.d. Loosdrecht	Internist-hematoloog		

Disclaimer

Het VUmc heeft richtlijnen opgesteld voor het uitvoeren van verpleegkundige handelingen op de afdeling hematologie. Het VUmc aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor welke vorm van gebruik van (delen van) deze richtlijnen dan ook door derden.