



Behandelinformatie

bij chemotherapie / immunotherapie

HOVON 71

tweede en derde kuur

acute lymfatische leukemie(ALL)

**Informatie over de vincristine,
adriamycine en dexamethason kuur**

Leeftijd vanaf 40 t/m 70 jaar

Deze kuur bestaat uit drie verschillende medicijnen. Daarnaast kunnen nog enkele andere medicijnen voorgeschreven worden. Deze dienen als ondersteuning van de behandeling, bijvoorbeeld om bijwerkingen te beperken.

De opname zal samen met het 1^{ste} behandelingschema 5-6 weken duren.

In het onderstaande schema kunt u zien op welke dagen de medicijnen worden gegeven.

		week 1							week 2							week 3							week 4						
		<i>dag</i>																											
		1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7
1 x daags	vincristine per infuus	■							■							■													
1 x daags	adriamycine per infuus		■	■	■																								
1 x daags	dexamethason tablet, 's ochtends innemen	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■							

De tweede kuur start direct na het 1^{ste} behandelingschema.

Vanaf de 4^e week zijn de cytostatica uw lichaam uit.

Bij deze kuur is het nodig om selectieve darm decontaminatie (SDD) medicijnen te gebruiken. U krijgt hier verdere uitleg over van de verpleegkundige

Na de kuur treedt soms een daling van de bloedwaarden op ("de dip") gevolgd door een herstelperiode. Het valt te verwachten dat deze dip ongeveer 1 week duurt.

Het is belangrijk dat u alle veranderingen, signalen en klachten doorgeeft aan de arts of verpleegkundige, ook als ze niet in de lijst op de volgende pagina voorkomen.

Disclaimer

Het VUmc heeft richtlijnen opgesteld voor het uitvoeren van verpleegkundige handelingen op de afdeling hematologie. Het VUmc aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor welke vorm van gebruik van (delen van) deze richtlijnen dan ook door derden.

In de **behandelwijzer chemotherapie** kunt u lezen welke bijwerkingen in het algemeen vaak voorkomen bij chemotherapie en welke algemene maatregelen u tegen een aantal van deze bijwerkingen kunt nemen.

Bij deze behandeling kunnen de volgende specifieke bijwerkingen optreden:

- Uw haar gaat uitvallen, dit is van tijdelijke aard en begint meestal “3 of 4 weken na de toediening. Dit begint vaak met een pijnlijke hoofdhuid. Een pruik kan nodig zijn. Het herstel van de haargroei begint na 5 weken na beëindiging van deze behandeling.
- Deze kuur kan misselijkheid, en braken veroorzaken. Dit kan gedurende de behandeling aanhouden. Het kan zijn dat u tijdelijk minder of geen trek hebt in eten.
- De aanmaak van bloedcellen in het beenmerg kan tijdelijk worden geremd. Door een tekort aan bloedplaatjes kunt u snel blauwe plekken en/of spontane bloedingen krijgen, b.v. neus of tandvleesbloedingen. Daarnaast kan de aanmaak van rode en/of witte bloedcellen geremd zijn, zodat u bloedarmoede kunt krijgen en een grotere kans op infecties heeft.
- Het slijmvlies van de mond kan ontstoken raken. U kunt daardoor blaasjes en pijn in de mond krijgen. Een goede mondverzorging is daarbij belangrijk.
- De slijmvliezen van de darm kunnen geïrriteerd raken. U kunt daardoor diarree krijgen. Neem bij diarree langer dan 2 dagen contact op met het ziekenhuis.
- Ten gevolge van vincristine kunnen zenuw beschadigingen optreden. Dit kan de volgende verschijnselen geven:
 - pijn in handen en voeten, vaak wordt dit waargenomen als een branderig gevoel of als speldenprikken.
 - een verminderd (doof) gevoel in de vingertoppen en tenen, dit uit zich vaak in tintelingen.
 - uw armen en benen kunnen zwaar aanvoelen (slapend gevoel).
 - een gestoorde waarneming in aanraking, pijn, temperatuur en positie. Wanneer u deze klachten heeft, wees dan alert op dingen zoals de temperatuur van het kraanwater en drempels.
 - door de aantasting van de zenuwen kunnen ook problemen met de urinelozing en klachten van obstipatie (verstopping) ontstaan. Wanneer deze klachten langer dan 2 dagen bestaan, is het belangrijk om contact op te nemen met de hematoloog.
- Door de adriamycine kan de urine tot enkele dagen na de kuur mogelijk een rode kleur krijgen.
- Ook het traanvocht kan getint zijn door de adriamycine. Het is verstandig om gedurende een week geen contactlenzen te dragen, omdat deze zouden kunnen verkleuren.
- Door de dexamethason kan uw eetlust tijdelijk groter worden. Er kan een tijdelijke vorm van suikerziekte ontstaan.
- Door de dexamethason kan uw stemming wisselen van heel erg goed tot neerslachtig.
- Hoofdpijnklachten kunnen voorkomen.
- Een plotselinge daling van de bloeddruk kan voorkomen wanneer u rechtop gaat staan. Dit kan leiden tot flauwvallen.
- Deze kuur kan van invloed zijn op de menstruatie, seksualiteit en vruchtbaarheid. De mate waarin is van vele factoren afhankelijk. Praat hierover met uw verpleegkundige en/of hematoloog.
- U kunt een algeheel gevoel van ziek zijn ervaren.
- U kunt ernstige vermoeidheidsklachten krijgen. Deze kunnen na afloop van de gehele behandeling aanhouden.

	Naam	Functie	Datum	Handtekening
Auteur	A.E. Nijntjes	Transplantatie coördinator		
Evaluatie	G.M.H. Bollen	Transplantatie coördinator		
Autorisatie	A.A. v.d. Loosdrecht	Internist-hematoloog		

Disclaimer

Het VUmc heeft richtlijnen opgesteld voor het uitvoeren van verpleegkundige handelingen op de afdeling hematologie. Het VUmc aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor welke vorm van gebruik van (delen van) deze richtlijnen dan ook door derden.