



Behandelinformatie bij chemotherapie / immunotherapie

HOVON 71

Onderhoudsbehandeling regulair en intensificatie A en B

Informatie over de onderhoudsbehandeling volgens HOVON 71

Acute lymfatische leukemie (ALL)

Leeftijd 40 tm 70 jaar

De onderhoudsbehandeling van het HOVON 71 schema duurt in totaal 30 maanden. De behandeling bestaat uit 3 verschillende kuur blokken. Elk blok is een combinatie van 4 verschillende medicijnen. Een blok bestaat uit 4 weken. Daarnaast kunnen nog enkele andere medicijnen voorgeschreven worden. Deze dienen als ondersteuning van de behandeling, bijvoorbeeld om bijwerkingen te beperken. Deze kuur blokken worden poliklinisch gegeven, op de dagbehandelingsunit polikliniek (Phem) of de klinische zorg eenheid 3B (KZE 3B)

Regulair PHEM		week 1							Week 2							week 3							week 4						
		dag																											
		1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7
1x daags	prednisolon per tablet	■	■	■	■	■	■	■																					
1x daags	vincristine per infuus	■																											
1x daags	methotrexaat per tablet								■						■						■								
1x daags	6 mercapto-purine per tablet								■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		

Het regulair schema wordt gegeven in maand 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 30.

Intensificatie A DBU-ZE3B		week 1							Week 2							week 3							week 4						
		dag																											
		1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7
1x daags	prednisolon per tablet	■	■	■	■	■	■	■																					
1x daags	vincristine per infuus	■																											
1x daags	cytarabine per infuus								■						■						■								
1x daags	etoposide per infuus								■						■						■								

Intensificatie A wordt gegeven in maand 4, 12, 20, 28.

Intensificatie B DBU-ZE3B		week 1							Week 2							week 3							week 4						
		dag																											
		1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7
1x daags	prednisolon per tablet																												
1x daags	vincristine per infuus																												
1x daags	mitoxantrone per infuus																												
1x daags	cyclofosfamide per infuus in 15 minuten.																												

Intensificatie B wordt gegeven in maand **8, 16, 24**.

De volgende kuur start in principe als de bloedsuitslagen goed zijn.

In de **behandelwijzer chemotherapie** kunt u lezen welke bijwerkingen in het algemeen vaak voorkomen bij chemotherapie en welke maatregelen u tegen een aantal van deze bijwerkingen kunt nemen.

Bij deze kuur kunnen eventueel de volgende specifieke bijwerkingen optreden:

- Deze kuur kan misselijkheid en braken veroorzaken. Het kan zijn dat u tijdelijk minder of geen trek hebt in eten.
- Uw haar gaat uitvallen, dit is van tijdelijke aard, en begint meestal in de 3^e of 4^e week. Het kan met een pijnlijke hoofdhuid beginnen. Een pruik kan nodig zijn. Herstel van de haargroei begint na 5 weken na het einde van de kuur.
- De aanmaak van bloedcellen in het beenmerg kan tijdelijk worden geremd. Als gevolg daarvan kunt u bloedarmoede krijgen, vatbaar worden voor infecties en u kunt snel blauwe plekken krijgen en/of last krijgen van spontane bloedingen.
- Het slijmvlies van de mond kan ontstoken raken. U kunt daardoor blaasjes en pijn in de mond krijgen. Een goede mondverzorging is daarbij belangrijk.
- Door de cytarabine kunnen de slijmvliezen van de ogen soms geïrriteerd raken. U kunt daardoor droge, prikkelende ogen krijgen.
- Door de cytarabine kan de huid ter plaatse van de handen, voeten en oren gaan vervellen.
- De slijmvliezen van de darm kunnen geïrriteerd raken. U kunt daardoor diarree krijgen. Neem bij diarree langer dan 2 dagen contact op met het ziekenhuis.
- Door de vincristine is obstipatie (verstopping) na de kuur mogelijk. Neem bij obstipatie langer dan 2 dagen contact op met het ziekenhuis.
- De beweeglijkheid van uw benen en/of armen kan minder worden. Als u van deze bijwerking last krijgt is het verstandig dit te melden bij uw behandelend arts.
- U kunt tintelingen en een doof gevoel in de vingertoppen en tenen krijgen.
- Als u van deze bijwerking last krijgt is het verstandig dit te melden bij uw behandelend arts.
- Door de prednison kan uw eetlust tijdelijk groter worden. Er kan een tijdelijke vorm van suikerziekte ontstaan.
- Door de prednison kan uw stemming wisselen van heel erg goed tot neerslachtig.
- U kunt vermoeidheidsklachten krijgen, ook na afloop van de gehele behandeling kunnen deze klachten aanhouden.
- Deze kuur kan van invloed zijn op de menstruatie, seksualiteit en vruchtbaarheid. De mate waarin is van vele factoren afhankelijk. Praat hierover met uw verpleegkundige en/of hematoloog.

Disclaimer

Het VUmc heeft richtlijnen opgesteld voor het uitvoeren van verpleegkundige handelingen op de afdeling hematologie. Het VUmc aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor welke vorm van gebruik van (delen van) deze richtlijnen dan ook door derden.

	Naam	Functie	Datum	Handtekening
Auteur	A.E. Nijntjes	Transplantatie coördinator		
Evaluatie	A.M.G. Kramer	Verpleegkundige DBU		
Evaluatie	I. Vree	Verpleegkundige DBU		
Autorisatie	A.A. v.d. Loosdrecht	Internist-hematoloog		